

## 東亞植物雜報(八)

正宗 嚴 敬

## Miscellaneous Notes on the Flora of the Eastern Asia VIII.

Genkei MASAMUNE

(昭和十四年一月九日受理)

65. **タイワンシタキサウ**、臺灣のシタキサウは、内地産の *Stephanotis japonica* MAK. でなく支那産の *Stephanotis mucronata* MERRILL である、之等二種の區別は、中井教授が大日本植物誌卷之一 438 頁に明記されて居るやうに、*S. mucronata* ではシタキサウと異り莖の毛は逆毛で、葉裏に褐色の絨毛、或は主脈に褐毛があるので葉を一見したのみでも區別する事が出来る。そこで私は、臺灣産の *S. mucronata* にタイワンシタキサウなる名を與へ内地産と區別する事にした。

***Stephanotis mucronata*** MERRILL Sp. Bl. p. 316 (1618)

**Syn.** *Apocynum mucronatum* Bl. Fl. Filip. ed. 1. p. 852 (1837)

*Stephanotis chinensis* CHAMP. ex BENTH. in Hook. Kew Journ. V. p. 53 (1853); SASAKI List. Pl. Formos. 342 (1928)

*Stephanotis japonica* (non MAK.) MORI in MASAMUNE Short. Fl. Formos. p. 175 (1936)

**Nom. Nippon.** Taiwansitakisô

**Hab.** In litore occidentale laci Gettan Taityû-syû Taiwan, Sept. 19 (1929) (leg. KUDO et SASAKI no. 15343!)

Ting Wu Shan, Kwangtun, China, May, 6, 1928 (leg. Y. CHUN no. 6417!)

66. **イリオモテキジヨラン**、沖縄縣西表島に一種のキジヨランを産する本種はキジヨランと異り、莖葉共に無毛、花瓣の切込深く、花筒の入口には毛がない、之等及その他の點でキジヨランと明に區別できるので、余は本種を一新種と認め次の學名を與へる事にした。

***Marsdenia iriomotensis*** MASAMUNE sp. nov.

Frutex scandens glaber. Ramuli pallide cinerei. Folia vix car-

Taiwan. Jul. 15, 1931 (leg. MASAMUNE et K. MORI); id. Jul. 19, 1937 (leg. S. SUZUKI) (Typ. in Herb. Taihoku Imperl. Univ.)

77. **ホソガクニヒタカリンダウ**、臺灣の高地に産するニヒタカリンダウの内萼片の基部がくびれず狭長な物がしばしば見られるが、之はニヒタカリンダウの變種とすべき物であらう、學名は次のやうにつけた。

***Gentiana scabrida* HAY. var. *angusta* MASAMUNE sp. nov.**

Annua? erecta ca. 15 cm alta; folia ovato-lanceolata vel linearilanceolata basi haud contracta apice acuto-acuminata 3×10 vel 2×10 cm magna. Sepala linearilanceolata apice acuto-acuminata basi haud contracta ca. 5 mm longa 1 mm lata.

**Nom. Nippon.** Hosogaku-nitakarindo

**Hab.** Nankotaizan inter Bunnakke et Kirittoï, Taihoku-syû, Taiwan, Jul. 15, 1931 (leg. MASAMUNE et K. MORI, Typ. in Herb. Taihoku Imper. Univ.)

78. **タイワンイハタバコ**、臺灣新竹州下に一種のイハタバコを産する、これはケイハタバコ (*C. ramondioides* var. *pilosum* NAK.) に非常によく似て居るが、花柄に線毛の他に鱗毛が混生して居るので區別できる、そこで余は之をイハタバコの一變種と考へ前記の和名を與へる事にした。本變種に極類似の物が、琉球列島の西表島に自生して居る、之は花柄に毛の無い點でイハタバコ (*C. ramondioides* var. *typicum* NAK.) に近いが、葉は無柄に近く又、葉縁の鋸齒は非常に弱く、波狀に近くなつて居るこれも又イハタバコの一變種と考へて好いのではないかと思ひ、イリオモテイハタバコ (*C. ramondioides* var. *ryukyuensis*) なる名稱を與へたく考へて居る。

***Conandron ramondioides* var. *taiwanensis* MASAMUNE var. nov.**

Folia saepe breve petiolata vel subsessilia carnosio-herbacea margine undulata et denticulata. Inflorescentia glanduloso-pilosa et sparse squamato-pilosa. Corolla ca 1.5 cm in iametro.

**Nom. Nippon.** Taiwan-iwatabako

**Hab.** Taiko? Byoritu, Sintiku-syû, Taiwan, Aug. 1, 1908 (leg. T. KAWAKAMI, HAYATA et U. MORI no. 76 Typ. in Herb. Taihoku Imper. Univ.); In the forest, Higasisensuizan, Sintiku-syû Jul, 7, 1932 (leg. FUKUYAMA no. 3554!)