

東亞植物雜報 (十七)

正 宗 嚴 敬

(昭和十五年一月九日受理)

Miscellaneous Notes on the Flora of the Eastern Asia XVII.

Genkei MASAMUNE

126. **ハクサンボク**、は本州、四國、九州に分布し琉球にはその變種と考へられる物を産する事は知られて居るが、ハクサンボクの産する事は不明で、屋久島が基本種の南限の産地であると考へて居たが、當大學の腊帶庫に、臺北州下の金山産のハクサンボクの標品があり、本種の臺灣に産する事が明になつたので此處に報ずる事にした。

Viburnum japonicum SPRENG., Syst. Veg. I. p. 934 (1825); MAXIM., in Mém. Biolog. X. p. 657 (1880); MATSUM., Ind. Pl. Jap. II. p. 603 (1912); SCHNEIDER, Ill. Handb. Lauholz. II. p. 643 f. c-d (1912); NAK., Tent. Syst. Capr. Jap. p. 30 (1921), et in NAK. et KOIDZ., Trees & shrub. Jap. ed. 2. I. p. 600 (1927); MASAMUNE, Fl. & Geobot. Stud. Yak. p. 426 (1924).

Syn. *Cornus japonica* THUNBERG, Fl. Jap. p. 63 (1784).

Viburnum Buegeri MIQ., in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 268 (1866); FR. et SAV., Enum. Pl. Jap. I. p. 201 (1875); KOCH., Dendr. II. 1. p. 65 (1872).

Nom. Nippon. Hakusanboku.

Hab. Formosa: Praef. Taihoku, prop. Kanayama, Feb. 12, 1939 (leg. Y. YAMAMOTO et HANADA in Heb. T.)

Note. The species is new to the flora of Formosa.

127. **リウキウチシヤノキ**、琉球列島産チシヤノキは、葉が厚質、隨圓形で基部は普通丸く、尖て居ない、又葉縁の鋸齒はチシヤノキ程細くない、そして花は密生する、萼片には僅に縁毛が生じて居るのみである。チシヤノキ

f. *kiiruninsularis* MASAMUNE f. nov.

Syn. *Callicarpa japonica* THUNB. var. *luxurians* (non REHD.) MASAMUNE. S. SUZUKI et K. MORI in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXIV. p. 411 (1934).

Folia ovato-lanceolata, coriaceo-chartacea ca. 5 cm longa 2 cm lata apice acuminata basi acuminato-cuneata.

Nom. Nippon. Kiirun-murasakisikibu.

Hab. Formosa: Kiirun-to, Kiirun, Taihoku-syū, VII 15, 1934 (leg. MASAMUNE, S. SUZUKI et K. MORI no. 106 Typ. in Herb. T.)

Callicarpa japonica THUNB., var. *luxurians* REHD., in SARG. Pl. Wills. III. 2. p. 369 (1916); NAK. in NAK. et KOIZ., Tr. & Shrub. Jap. ed. 2. p. 454 f. 215 (1927); MASAMUNE, Fl. & Geob. Yak. p. 387 (1934).

Syn. *Callicarpa australis* KOIDZ., in Tokyo Bot. Mag. XXX p. 326 (1916).

Callicarpa japonica THUBE.; MASAMUNE et S. SUZUKI, in Ann. Rep. Taih. Bot. Gard. III. p. 66 (1933); K. MORI, in MASAMUNE Short Flor. Foamos. p. 179 (1936).

Nom. Nippon. Ōmurasakisikibu.

Hab. Formosa: Insl. Kizan, Taihoku-syū, VII. 3, 1932 (leg. MASAMUNE et S. SUZUKI in Herb. T.)—Ryūkyūs: Iheya-zima, VII 15, 1935 (leg. S. SUZUKI no. 2530 in Herb. T.), Nase, Amami-Osima, Kagosima-ken, X (leg. OHBA no. 90 in Herb. T.), Komi, Iriomote-zima, Yaeyama-gun, Okinawa-ken, IV 4, 1935 (leg. MASAMUNE no. 2527 in Herb. T.)—Kyūsyū: Utiumi, Miyazaki-ken, IX 8, 1920 (leg. MATUDA-eizi no. 2819 in Herb. T.)

134. チクシムラサキシキブ、大屯山麓の内竹仔湖、大屯平小観音方面に一種のムラサキシキブを産する、一見した、所ホウライムラサキシキブに似て居るが、全體に星状毛が少く特に、二年目の枝條葉に少い、又葉は小さく狭長である、又ランゲイムラサキシキブに以て居るが、これよりは葉が廣く、鋸齒が遙に細かいので區別できる、即ち本種は此等二種の間にくる一新種と考へられるので上記の和名及次の學名を與へる事にした。

Callicarpa tikusikensis MASAMUNE sp. nov.

Frutex ca. 1 m altus. Rami validiusculi cinerascetes, juveniles stellato-tomentosi. Folia opposita petiolata, (petiolis ca. 5 mm longis

cinerascenteo-stellato-tomentosis) ovato-elliptica, elliptica, ovato-lanceolata vel rhomboideo-elliptica, chartacea 3×1, 6×2, 7×2, 8×2.5 vel 9×2.5 cm magna apice acuminata vel cuspidato-acuminata vel acuta, basi cuneata, obtusa vel vix rotundata margine minute apiculato-serrata, costis subtus prominente supra leviter elevatis, venis primariis utrimque latere 6-9 suboppositis, ad costas venasque stellato-tomentosa et sparse hirsuta, supra pubescentia subtus pallidiora et subglabra. Cymae axillares subdense racemosae, ramis divaricatis, stellato-tomentosis, pedicellis ca. 1.5 mm longis, bracteis minutis subulatis. Drupa globosa purpurea ca. 4 mm crasa, pyrenis saepe 3 ellipticis dorso convexis ventrali concavis albo-flavis ca. 2 mm longis 1.5 mm latis.

Nom. Nippon. Tikusi-murasakisikibu.

Hab. Formosa: Syokannon-zan, Sitisei-gun, Taihoku-syū, X. 1, 1939 (leg. T. NAKAMURA no. 3956 in Herb. T.), Tikusiko, Sitisei-gun, Taihoku-syū, X, 7, 1939 (leg. T. NAKAMURA no. 3968 Typ. in Herb. T.)

135. **タイワンツルリンドウとツルリンドウ**、和は no. 30 に於てタイワンツルリンドウのみが臺灣に産するように記したが、ツルリンドウも産するので此所に訂正する、さきにも記したように、タイワンツルリンドウはツルリンドウより花が大きく白色である事により區別出來主として臺灣の照葉樹林帯の下方より現れる、ツルリンドウの方は多くの場合これよりやゝ高所に分布して居る

Crawfordia japonica SIEB. et ZUCC.; MASAMUNE Fl. & Geob. Yak. p. 373 (1934). Flores purpurascens.

Nom. Nippon. Tururindō.

Hab. Formosa: Taiton-zan, Sitisei-gun, Taihoku-syū, I. 3. 1940 (leg. MASAMUNE no. 2618 in Herb. T.)

Crawfordia japonica SIEB. et ZUCC. var. **taiwanensis** MASAMUNE, in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXVIII. p. 144 (1938) p.p.

Flores albi.