

紅頭嶼産 *Cyrtandra* 屬の一新種と 屬分布に就いて

細 川 隆 英

(臺北帝國大學植物分類生態學研究室)


**On the generic distribution of *Cyrtandra* (*Gesneriaceae*),
with the discription of a new species from Botel Tobago.**

by

Takahide HOSOKAWA

Cyrtandra 屬は季節風帯及其の附近に分布する *Gesneriaceae* 科に屬するものであつて最近 (1930 年) までに知られてゐる種類は約 500 有餘に達してゐる。A. Engler 氏により想定された Monsungebiet 及其の附近内に於ける分布を示せば下記の表及下圖の如くである。

Monsungebiet	Botel Tobago (Formosa)		1 sp.	
	Provinz der Philippinen		91 spp.	
	Südwest-malayische Provinz	Malaiische Halbinsel	13 spp.	154 spp.
		Sumatra	52 spp.	
		Java	26 spp.	
		Borneo	63 spp.	
	Zentro-malayische Provinz	Celebes	14 spp.	21 spp.
Molukken		7 spp.		

Figure showing the distribution of *Cyrtandra*

モドキ) は紅頭山麓及大森山方面の山岳上部の原生林内に一米半位の灌木として生育してゐるものである。

Cyrtandra kotoensis* HOSOKAWA, *sp. n.

Near to *C. umbellifera* MERR. from the Batan Island, but the present species differs in having leaves with oblique bases and much shorter subulate calyx-lobes.

Arbuscula ca. 1.5 m. alta. Ramus quadrangularis, glaber, tamen partibus novellis ferrugineo-hirsutis. Folia opposita, petiolata, petiolis hirtis 1-4 cm. longis; lamina falcato-oblongo-elliptica, apice acuminata, basi obliqua et acuta, margine crenato-serrata, vel remotissime serratuscula, membranacea, 9-11-pinninervia, supra glabra viridia, subtus pallida scabra glabra, tamen ad nervos sparse ferrugineo-pilosa, 18-25 cm. longa, 4.5-6.6 cm. lata. Inflorescentia umbellata, axillaris, solitaria, umbella pedunculata, pedunculis dense ferrugineo-hirsutis 2 cm. longis ad apicem bracteatis, bracteis lanceolatis membranaceis 0.5-0.7 cm. longis. Fructifer pedicellus gracilis, ca. 1 cm. longus, dense ferrugineo-hirsutus. Bacca novella glabra, cum calyce et stylo elongato persistente. Calyx extus hirtus, 5-lobatus, lobis subulatis 1.5 mm. longis.

Nom. Jap. コウトウイハタバコモドキ (新稱)

Hab. *Eormosa*:—The island of Botel Tobago, in a primary forest at the upper altitudes of Mt. Koto (T. HOSOKAWA, no. 8129! VII. 12, 1935.....*Type in Herb. Taihiku Imp. Univ.*)

主なる文献

- C. B. CLARKE, in A. et C. DE CANDOLLE: Monogr. Phanerog. V. (1883-7) pp. 201-286.
- W. HILLEBRAND: Fl. Hawaii. Isl. (1888) pp. 324-338.
- K. FRITSCH in ENGL. u. PR. Nat. Pfl. IV. 3b. (1891) S. 162-165.
- E. D. MERRILL, in Philipp. Journ. Sci. III. Bot. (1908) pp. 434-435.
- S. H. KOORDERS: Exk. Fl. Java. III. (1912) S. 197-202.
- E. D. MERRILL: Enum. Philipp. Pl. III. (1923) pp. 456-465.
- R. SCHLECHTER, in ENGL. Bot. Jahrb. LVIII. (1923) S. 308-367.
- H. RIDLEY: Fl. Malay Penins. II. (1923) pp. 543-547.
- HOOKER et JACKSON: Index Kewensis I. (1895) pp. 702-703.
- : Suppl. I. (1901-1906) pp. 125-126.
- : Suppl. II. (1904) p. 54.
- : Suppl. III. (1908) p. 56
- : Suppl. IV. (1913) p. 65
- : Suppl. V. (1921) pp. 75-76
- : Suppl. VI. (1926) pp. 60-61
- : Suppl. VII. (1929) pp. 65-66
- : Suppl. VIII. (1933) p. 68.