

**OSHIMELLA, A NEW GENUS OF GESNERIACEAE
FROM FORMOSA***

G. MASAMUNE & S. SUZUKI

(Received for publication, Oct. 10, 1934)

Oshimella formosana, MASAM. et SUZUKI, *gen. et sp. nov.*

Herbae perennes, carnosules, pubescentes, sursum erectae deorsum repentes, et ad nodos radicanes, ca. 15 cm altae. Folia alterna, haud petiolata, oblique elliptica, ca. 3 cm longa, 1.5 cm lata, utraque pubescentia, margine serrulata, apice acuta vel acumiata, basi balde obliqua. Cymae axillares non bracteatae, neque bracteolatae, ca. 5 cm longae 2-8 floriferae. Calyx membranaceus late campanulatus, 5-fidus, fidis vix imbricatis deltoideis ca. 2.5 mm longis 2 mm latis apice acutis, ad marginem et extus vix hirsutis. Corolla alba tuboso-infunbuiformis, limbus 2-labiatus, labio postico 2-3-fido, antico multo majore patente 3-fido. Samina 4 perfecta, subdydinama infra medium tubum affixa, inclusa, filamentis filiformibus, 5 mm longis; anterae ovato-reniformes, loculis divaricatis mox in unum late apertum confluentibus; staminodium nullum. Ovarium ovoideum superum, ca. 2 mm longum 1.5 mm latum glabrum; stylus elongatus glaber ca. 2 mm longus stigmate vix oblique dilatato obscure 2-lobo. Capsula calyce subaequalia, vix depresso-globosa ca. 2.5 mm longa, 2.5 mm lata, in valvas 2 membranacas medio placentiferas dehiscens. Semina minima ellipsoidea ca. 1/5 mm longa vix sulcata, apice oblique rotundata vel truncata, basi acuminata.

NOM. JAP. *Sirobukuro*

HAB. Urai, Taihoku-Shû (MATUDA-Eizi, 25 VII 1918); Doba, Taihoku-Syû (SUZUKI, 19 VIII 1925; 7 XI 1927; 1 VIII 1928; 28 VII 1929); Sakahen, Kwarenkô-Tyô (SUZUKI, 21 VIII 1929, No. 1739, Typus!)

Oshimella Sasakii (Hay.) *Comb. nov.*

Note. 本属は *Rhynchoglossum* と *Klugia* とに似て居るが、是等二属が总状花序を有するに反し、聚繖花序を有するので新属と他の二属とは容易に區別出来る、又 *Rhynchoglossum* は完全雄蕊二箇を有つが本属は四箇をもつ點で異つてゐる、此の點に於ては寧ろ *Klugia* に近い。そこで吾々は此の物を前記二属の中間にくる新属と考へ其の属名とし、故大島博士を記念するために *Oshimella* なる属名をつける事にした。

ホルリブクロ (*Rhynchoglossum Sasakii*, HAY.) も亦此の属に入ると考へられるので次の様な新組合を行ふ事にした。

Oshimella Sasakii, (HAY.) MASAM. et SUZUKI, *comb. nov.*

Syn. *Rhynchoglossum Sasakii*, HAY., Ic. Pl. Formos. VI. p. 34 (1916)



シロブクロ (*Oshimella formosana*, MASAM. et SUZUKI, gen. et sp. nov.)