

## 東亞植物雜報(八)

正宗嚴敬

Miscellaneous Notes on the Flora of the Eastern Asia VIII.

Genkei MASAMUNE

(昭和十四年一月九日受理)

65. タイワンシタキサウ、臺灣のシタキサウは、内地産の *Stephanotis japonica* MAK. でなく支那産の *Stephanotis mucronata* MERRILL である、之等二種の區別は、中井教授が大日本植物誌卷之一 438 頁に明記されて居るやうに、*S. mucronata* ではシタキサウと異り莖の毛は逆毛で、葉裏に褐色の絨毛、或は主脈に褐毛があるので葉を一見したのみでも區別する事が出きる。そこで私は、臺灣産の *S. mucronata* にタイワンシタキサウなる名を與へ内地産と區別する事にした。

*Stephanotis mucronata* MERRILL Sp. Bl. p. 316 (1618)

*Syn. Apocynum mucronatum* BL. Fl. Filip. ed. 1. p. 852 (1837)

*Stephanotis chinensis* CHAMP. ex BENTH. in Hook. Kew Journ. V. p. 53 (1853); SASAKI List. Pl. Formos. 342 (1928)

*Stephanotis japonica* (non MAK.) MORI in MASAMUNE Short. Fl. Formos. p. 175 (1936)

*Nom. Nippon.* Taiwansitakiso

*Hab.* In litore occidentale Iaci Gettan Taityū-syū Taiwan, Sept. 19 (1929) (leg. KUDO et SASAKI no. 15343 !)

Ting Wu Shan, Kwangtun, China, May, 6, 1928 (leg. Y. CHUN no. 6417 !)

66. イリオモテキジョラン、沖繩縣西表島に一種のキジョランを產する本種はキジョランと異り、莖葉共に無毛、花瓣の切込深く、花筒の入口には毛がない、之等及その他の點でキジョランと明に區別できるので、余は本種を一新種と認め次の學名を與へる事にした。

*Marsdenia iriomotensis* MASAMUNE sp. nov.

*Frutex scandens glaber. Ramuli pallide cinerei. Folia vix car-*

3-lobato, lobo terminali oblongo-ovato 3.5 cm longo 2 cm lato apice acuto margine sursum serrato deorsum integro, partitis lateralibus oblique cuneiformibus, oblique latere superiore lobulo 1, latere inferiori lobulis saepe 2 instructis, lobulis triangulari-acutis, sinibus inter lobulos obtusis. Folia superiora cum basalis similia sed minora et angustiora. Flores laxissime cymosi vel solitarii axillares vel terminales longe pedunculati, pedunculis 2-7 cm longis, bracteis interdum trifidis vel interdum simplicibus lanceolatis. Sepala 5, ovata 6 mm longa 3 mm lata apice obtusa vel acuta basi rotundata intus sparsissime extus sparse hirsuta. Petala 5 obovato-oblonga 8 mm longa 2.5 mm lata, apice rotundata basi obtusa unguiculato-contoracta, intus basi squumulo acuto minuto uno instructa. Achacnia ca. 20 vix oblique ovato-globosa 6 mm longa 4 mm lata subitto attenuata ad stylum persistentem apice recurvum ca. 1 mm longum abeuntia.

*Nom. Nippon.* Irino-omotekinpoge (Yaeyamakinpoge ex Y. TASHIRO ?)

*Hab.* On the wet ground in the Iourisilvae in the catchment area of the Nakaragawa, insl. Iriomote, Yaeyama-gun, Okinawa-ken, Mai. 29, 1938 (leg. FUKUYAMA no. 7092, 7091, 7093 Typ. in Herb. Taihoku Imperial Univ.)

76. タチアカネ、臺灣北部の高山南湖大山の中腹に、蔓性でない直立するアカネを産する。本植物はアカネの一變種と見るべき物と考へられるので余は、これに前記和名を與へ *Rubia cordifolia* LINN. var. *erecta* なる學名を數年前與へてをいたのであるが、中井先生がアカネは *R. corbifolia* でない事を明にされ、*R. akane* なる新名を與へられたので、この御説にしたがつて次の學名を與へる事にした。

*Rubia akane* NAK. var. *erecta* MASAMUNE var. nov.

Perennis? Caulis erectus ca. 30 cm altus tetragonis scaber. Folia 4 verticillata petiolata, petiolis 5-15 mm longis, laminis chartaceis ovato-cordatis ca. 3.5×2 cm magnis apice cuspidato-caudatis, basi cordatis margine et supra scabris, subtus subdense hirsutis, saepe 7 nervatis, nervis subtus elevatis supra depresis. Flores pauci in cymas axillares et terminales dispositi. Fructus niger globosus ca. 5 mm in diametro.

*Nom. Nippon.* Tati-akane

*Hab.* Mt. Nankotaizan, inter Bunakke et Kirittoi, Taihoku-syū,

Taiwan. Jul. 15, 1931 (leg. MASAMUNE et K. MORI); id. Jul. 19, 1937  
(leg. S. SUZUKI) (Typ. in Herb. Taihoku Imperl. Univ.)

77. ホソガクニヒタカリンドウ、臺灣の高地に産するニヒタカリンドウの内萼片の基部がくびれず狭長な物がしばしば見られるが、之はニヒタカリンドウの變種とすべき物であらう、學名は次のやうにつけた。

**Gentiana scabrida HAY. var. angusta MASAMUNE sp. nov.**

Annua? erecta ca. 15 cm alta; folia ovato-lanceolata vel linearilanceolata basi haud contracta apice acuto-acuminata 3×10 vel 2×10 cm magna. Sepala linearilanceolata apice acuto-acuminata basi haud contracta ca. 5 mm longa 1 mm lata.

*Nom. Nippon.* Hosogaku-niitakarindo

*Hab.* Nankotaizan inter Bunnakke et Kirittoi, Taihoku-syū, Taiwan, Jul. 15, 1931 (leg. MASAMUNE et K. MORI, Typ. in Herb. Taihoku Imperl. Univ.)

78. タイワニイハタバコ、臺灣新竹州下に一種のイハタバコを産する、これはケイハタバコ (*C. ramondioides* var. *pilosum* NAK.) に非常によく似て居るが、花柄に線毛の他に鱗毛が混生して居るので區別できる、そこで余は之をイハタバコの一變種と考へ前記の和名を與へる事にした。本變種に極類似の物が、琉球列島の西表島に自生して居る、之は花柄に毛の無い點でイハタバコ (*C. ramondioides* var. *typicum* NAK.) に近いが、葉は無柄に近く又、葉縁の鋸歯は非常に弱く、波状に近くなつて居るこれも又イハタバコの一變種と考へて好いのではないかと思ひ、イリオモテイハタバコ (*C. ramondioides* var. *ryukyuensis*) なる名稱を與へたく考へて居る。

**Conandron ramondioides var. taiwanensis MASAMUNE var. nov.**

Folia saepe breve petiolata vel subsessilia carnoso-herbacea margine undulata et denticulata. Inflorescentia glanduloso-pilosa et sparse squamato-pilosa. Corolla ca 1.5 cm in iametro.

*Nom. Nippon.* Taiwan-iwatabako

*Hab.* Taiko? Byoritu, Sintiku-syū, Taiwan, Aug. 1, 1908 (leg. T. KAWAKAMI, HAYATA et U. MORI no. 76 Typ. in Herb. Taihoku Imperl. Univ.); In the forest, Higasisensuzan, Sintiku-syū Jul. 7, 1932 (leg FUKUYAMA no. 3554 !)