

OBSERVATIONES AD FLORAM FORMOSANAM. V

(Continuatio ab voluminis IV. No. 3. pag. 307)

Yoshimatsu YAMAMOTO

(Received for publication November 15, 1932)

(38) *Adenophora Uehatae* YAMAMOTO, sp. nov. (Fig. 5)

Suffrutex basi ramosus et prostratus validusque, sed superne simplex erectusque, circ. 10 cm. altus, basi caespitosus, superne foliatus, usque pubescens. Folia alternatim disposita, inferiora elongato-elliptica vel lanceolata, superiora linearis-lanceolata vel linearia, 2.5-3 cm. longa, plerumque 5-10 mm. lata, apice acuminata, basi acuta vel cuneata, margine dentato-serrata, (serris utroque latere 4-6), paginae utraque pubescentia, supra viridia et plus minus scabra, subtus pallida et subreticulata. Flores ad ramum terminales, simplices, majores, patente 3 cm. longi et lati. Tubi calycis brevi-cylindrici vel plus minus obconici, 5-6 mm. longi, 4 mm. in diametro, 5 costati, dense pubescentes, ad orem laciniato-5-partiti; laciniis linearibus vel subacerosis 8-9 mm. longis circ. 1 mm. latis utroque latere 1-3-serrulatis (serrulis brevi-aristatis), extus pubescentibus intus glabris medio 1-nervatis. Corolla campanulata, caerulea, 2.5 cm. longa, superne 5-lobata, nervis principalis atrocaeruleis colorata; lobis late triangularibus 7 mm. longis 9 mm. latis apice acutis. Stamina 5, cum filamentis 12 mm. longa, inclusa; filamentis 11 mm. longis, sphaerioribus filiformibus 3 mm. longis glabris, inferioribus dilatatis ovatis 2.5 mm. longis 2 mm. latis margine densissime molliterque ciliato-barbatis; antheris linearibus 5.5 mm. longis 0.5 mm. latis. Discus lato-cylindricus, 2.5 mm. in diametro, circ. 1 mm. altus, crassatus, ad orem leviter lobatus, basin stylis amplectans. Styli filiformes, 1.7 cm. longi, superne leviter gradatim dilatato-clavati, apice breviter 3-lobati, lobis oblongis intus stigmatiferis.




Fig. 5.
Adenophora Uehatae YAMAMOTO (Y. Y. Phot.)

NOM. JAP. Taizan-iwagikyo (nov.)

HAB. In monte Nankotaizan, ad circ. 12000 ped. alt., leg. T. UEHATA, 19, Jul. 1932.

NOTA. Arcte affine *A. Tashiroi* MAK. et NAK., sed frutice plerumque circ. 10 m. alto, lobis calycinum laxe serratis, flore majori, exqua differt.

(39) **Sedum cryptomerioides** BARTLETT et YAMAMOTO, sp. nov.

Herba; Caulis basi fasciculatus, e basi multi-radicans, superne approximatim foliatus, plerumque simplex erectusque, 3-5 cm. altus. Folia dense spiraliterque disposita, squamaeformia, oblonga vel plus minusve spathulata crassaque, 6-7 mm. longa, 1.5 mm. lata, 0.7 mm. crassa, apice obtusissima, basi plus minusve soluta et rotunda-to-producta, integririma, glaberrima. Alabstrum cymae subcapitatum congestum. Cyma dichotome vel trichotome divaricata, floribus terminalibus. Sepala plerumque 5, aequalia, raro 6 vel 7 subaequaliaque, oblonga, viridia, glabra, 2 mm. longa, 0.7 mm. lata, apice obtusissima. Petala plerumque 5 rarissime 6, aequalia, lanceolata, naviculaeformia, 4 mm. longa, 1.2 mm. lata, apice mucronata, extus dorsoque crassato-convexa, margine membranacea, glabra. Stamina 10, cum antheris 4 mm. longa, 2-seriata, exteriora sepalis alternata, interiora supra basin petalis adnata, filamentis longis filiformibus, antheris ovatis 0.5 mm. longis utrinque emarginatis, loculis extrosis. Grandulæ 5, petalis oppositæ, latae ovatae. Capella 5, soluta, distincta, lanceolato-fusiformia, 3 mm. longa, 0.6 mm. lata, apice acuminata, deorsum plus minusve incurvata, apice paulo recurvata, subtriangulare. Semina minima, longe elliptica, 0.6 mm. longa, 0.2 mm. in diametro; testa brunnea, longitudin-aliter punctata.

NOM. JAP. Kosugi-mannengusa (nov.)

HAB. In monte Nokozan, ad 9000-10000 ped. alt., leg. H. H. Bartlett, Oct. 1926 (No. 610-H.); in monte Nankotaizan, ad circ. 10000 ped. alt., leg. T. UEHATA, Jul. 1932.

NOTA. Haec planta folio approximatim spiraliterque disposito et suborizae-formi crassatoque notabilissima est.

(40) **Paracyclea insularis** (MAK.) KUDO et YAMAMOTO, in Bot. Mag. Tokyo, XLVI. (1932) No. 544, p. 157.

Cissampelos insularis MAK. in Bot. Mag. Tokyo, XXIV. (1910) p. 227; Mak. et Nemoto, Fl. Jap. ed. (1931) p. 351.

NOM. JAP. Miyakojima-tsuzurafuji.

HAB. Ins. Okinawa: Nago, leg. Y. SIMADA, 23 Junio 1932.

DISTRIB. In Japonia australi (Kiu-shiu) et Riu-Kiu Archipelago.

(41) **Ilex euryaefolia** MORI et YAMAMOTO, sp. nov.

Rami longitudinaliter plus minusve rugosi, annotini effoliati glabratique, hornotini foliati pubescentesque. Folia coriacea, alternata, longe elliptica vel oblongo-ob lanceolata vel subspathulata, petiolata, 4.-5.5 cm. longa, 1.5-2 cm. lata,

1915; Sozan, leg. R. KANEHIRA et S. SASAKI, Mart. 1916 (typus); Mokusaku, prov. Taihoku, leg. K. YAMADA, 14 Nov. 1930 (ramus fructifer).

DISTRIB. Endemica in Formosa.

NOTA. Affine *Ilex Mutchagara* MAK., sed folio majori, fructu oblongo, exqua differt.

(Continuabitur)

Mense Nov. anni 1932

Instit. Bot., Facult. Sci. et Agric.

Univ. Imp. Taihoku, Formosa,

Japan.

臺灣植物考察第五

(第四卷第三號、三百七頁より續き)

山本由松

摘要

(38) タイザンイハギキヨウ (*Adenophora Uehatae* YAMAMOTO, sp. nov.) は南湖大山海拔約一萬二千尺の高山に生し、シマシヤジン (*A. Tashiroi* MAKINO et NAKAI) に似た植物であるが莖は莖部に於て分枝し、上部は單立、高さ約 10 釐内外の小灌木性のもので葉の裂片は鋸齒状なる事、花はより大きい事、雄蕊の膨大部の形の異なるので區別される。採集家上垣螺義君の名に因みその種名とした。

(39) コスギマンネングサ (*Sedum cryptomerioides* BARTLETT et YAMAMOTO, sp. nov.) は始め Michigan 大學植物園長 H. H. BARTLETT 氏を能高山に採集されたるもので葉は密生して恰もダイコメの如く、又杉の小枝の如く、花は莖上に稍々密集して居るので著しい。今夏臺北一中教授上垣氏は同種を南湖大山に採集された。

(40) ミヤコジマツマラフチ (*Paracyclea insularis* (MAKINO) KUDO et YAMAMOTO) は宮古島にて發見され、鹿児島の南部にも又生せらる。島田新市氏今夏沖縄島に採集された。將來臺灣の北部や東部にも發見されるであらう事を豫想するものである。

(41) サカキバイヌツゲ (*Ilex euryaefolia* MORI et YAMAMOTO, sp. nov.) は鈴木時夫君始め太平山ムルロアフとキヤウラハ間で採集せるもの。形態頗るナガバイスツゲ (*J. scoriata* KOIDZ.) に似て居るが葉は遙に大きき裏面又彼の如く蒼白色ならず全くその趣は一見アツバヒサカキ (*Eurya glaberrima* HAY.) に勢揃るものがある。

(42) ウライソヨゴ (*Ilex uraiensis* YAMAMOTO, sp. nov.) は著者が 1924 年に已に原標本に手記して未發のまゝとなつて居たものであるがかの沖縄産のムツチャガラ (*J. Mutchagara* MAK.) と比較すると葉が遙に大きくて廣い事、果實は大きくて長味のある點で明かに區別るべき種類である。全體葉の様子は大に趣を異にして居る。

(昭和七年十一月十日)

臺北帝國大學理農學部植物學教室