

## 東亞植物雜報(七)

正宗嚴敬

## Miscellaneous Notes on the Flora of the Eastern Asia VII.

Genkei MASAMUNE

(昭和十三年十月二十一日受理)

57. ホウライギク、當教室の森君が、鹿陽大山で、ギク属の一種を探集し、余に與へられた、本種はモリギクに似て居るが頭狀花序及葉共に小さく、又莖は普通直立して居る。之等その他の點で、モリギクとは異なる新種と考へられるので、余は此を一新種とする事にした。本種の花を見たのは今度がはじめてあるが、臺灣の高地には可成り廣範囲に亘り本種は分布して居るやうである。

*Chrysanthemum horaimontanum* MASAMUNE sp. nov.

Herba perennis dense argento-pubescentia. Folia alterna in umbitu obovata, subcordata, supra subdense subtus dense argenteo-pubescentia, pinnatilobata, basi cuneato-decurrentia, superiora minora, basalia ominia majora ca. 24 mm longa 17 mm lata. Stipulae obovatae ca. 5 mm longae 2 mm latae haud lobatae. Involucra subglobosa ca. 5 mm longa et lata, squamis extraneis ovatis basi vix contractis apice acuminatis, sed ad sumis obtusis raro bi- vel tri-partitis, intus glabris extus pubescentibus, margine vix undulatis 3-6 mm longis 1-3 mm latis, squamis intimis oblongo-lanceotatis hyalinis, utrimque glabris apice obtusis basi haud contractis, margine vix undulatis et deorsum saepe hirsutis 4-6 mm longis 2-3 mm latis. Flores ♀ marginales 1-seriatim siti albi, tubo 2 mm longo, limbo liguliformi oblanceolato 6 mm longo 2.5 mm lato apice obtuso vel emarginato intus glabro, extus deorsum vix papillato sed cetero glabro, stylo 2 mm longo glabro, apice bilobato, lobis ca.  $\frac{1}{2}$  mm longis apice truncatis. Flores disci ♂: corolla tubulosso-campanulata 2 mm longa apice 4-5 lobata, lobis triangularibus ca. 0.5 mm longis. Stamina 5 basi limbi oriunda, filamentis filiformibus glabris, antheris linearibus ca.  $\frac{3}{5}$  mm longis; Stylus ut floris foeminei.

*Nom. Nippon.* Horaigiku

*Hab.* Taiwan, Taityu-syū, Tosei-gun, Sikayotaizan, Oct. 25, 1936  
(leg. K. MORI ! Typ. in Herb. Taihoku Imperl. Univ.)

58. シカヤウツツジ、前種同様シカヤウ大山で森君の採集されたツツジ属の新種で、タイントツツジ (*Rhododendron longiperulatum*) に似て居るが葉が狭く花期が秋である點で異つて居り、萼片が狭長で、雄蕊はタイントツツジより小數である。

*Rhododendron sikayotaizanensis* MASAMUNE sp. nov.

Frutex. Ramuli pilis squamiformibus dense obtecti. Folia oblonga vel ovato-oblonga 4-14 mm longa 2-6 mm lata coriacea supra tenuiter parce adpresso hirsuta, subtus ad costas dense pilosa, apice acuta ad summum apiculata, basi cuneata vel acuta, venis primariis later-alibus utroque latere costae 2-4 arcuato-flexuosis cum venis proximis superioribus areolam formantibus. Flores 2-3 fasciculati terminales, pedicellis saepe 1 cm longis subdense pilosis. Sepala 5 linear-lanceolata vel ovato-lanceolata ca. 4 mm longa 1.5 mm lata, apice acuta basi haud contracta margine longe ciliata, ciliis ca. 2 mm longis, intus glabra, extus ciliata. Corolla rubella campanulata ca. 2 cm longa, 2 cm in diametro, 5-lobata, lobis oblongis apice rotundis. Stamina 4-5-6 inaequalia, filamentis deorsum sparse hirsutis, antheris oblongo-ellipticis 1½ mm longis 1 mm latis. Ovarium ovato-conicum ca. 3 mm longum 1.5 mm latum, pilis 2 mm longis dense obtectum, stylo glabro 21 mm longo apice dilatato.

*Nom. Nippon.* Sikayo-tutuzi

*Hab.* Taiwan, Taityu-syū, Tosei-gun, Sikayotaizan. Oct. 26, 1936  
(leg. K. MORI Typ. in Herb. Taihoku, Imp. Univ.)

59. マルミシシアクチ、シシアグチの果實は BLUME の記事によると上下に壓せられた偏平な五角形に近い物であるやうであり、日本南部産の物は此點この記載によく一致して居る、所で臺北帝大臘葉館にある海南島産の *Ardisia quinquegona* Bl. とされて居る物の標品を見ると、果實は橢圓形で兩端が尖つて居る、此點は BLUME の記載と全く異て居り又日本産の物より葉が薄いやうに見受けられるので、之は *Ardisia quinquegona* Bl. でなく他の種のやうに思はれるので私は之に *Ardisia pseudoquinquegona* の名稱を與へる事にした、所が *Ardisia quinquegona* は支那産の物につけられ